RESUMEN

Durante la práctica en empresa se realizó el seguimiento fitosanitario del cultivo de trigo pan (*Triticum aestivum* L.) en un lote de producción del sudeste bonaerense, campaña 2024/25. La práctica se desarrolló en la estancia El Robledal del partido de Gral. Pueyrredón (37°50'48.1"S; 57°42'15.9"O). El seguimiento agronómico se realizó sobre dos variedades de trigo de ciclo intermedio: Baguette 620 (Nidera) y DM Pehuén (Don Mario). Luego de la siembra del cultivo se realizaron visitas semanales de recorrida al lote con el fin de verificar la correcta emergencia y establecimiento del cultivo, el número de plantas y la fenología. Además, a partir de macollaje se realizaron monitoreos de enfermedades, se registró la incidencia y severidad de las distintas enfermedades presentes en el cultivo hasta su cosecha. La variedad B620 presentó mayor incidencia de mancha amarilla y roya amarilla a comienzo de encañazón que DM Pehuén. En ese momento se aplicó en ambas variedades una triple mezcla compuesta por triazol, estrobirulina y carboxamida a dosis de marbete. En estadios avanzados, a partir de espigazón, B620 presentó roya amarilla y roya anaranjada resultando en una aplicación de fungicida triazol más estrobirulina solo en esa variedad. Los rindes obtenidos superaron los 7000 kg/ha, siendo 450 kg/ha mayor en B620. El margen bruto fue mayor en la variedad B620 a pesar de tener un mayor costo directo por la segunda aplicación de fungicidas.

Palabras clave: trigo pan, roya, manchas foliares, monitoreo